

# GE224 過敏檢測報告

姓 名 王小華


性 別

編 號

報告日期 2013/11/12

醫療院所 醫師

Allergen Screen by  
Protein Chip  
Microarray



本報告僅供醫師參考


# GE224 過敏檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：2013/11/12

	<b>IgE急性過敏反應指標</b>		<b>IgG慢性過敏反應指標</b>
--	--------------------	--	--------------------




# GE224 過敏檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：2013/11/12




# GE224 過敏檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：2013/11/12



# GE224 過敏檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：2013/11/12

## IgE急性過敏反應圖譜

IgE急性過敏反應圖譜		
重度	6級	螃蟹；
重度	5級	屋塵蟎；粉塵蟎；蝦子；
中度	4級	刺芫草；牡蠣；花枝；
中度	3級	早熟禾；相思樹；鵝肉；芹菜；南瓜；
輕度	2級	木麻黃；熱帶無爪蟎；豬肉；雞肉；鮪魚；菠菜；豌豆夾；木瓜；咖哩；
輕度	1級	羊毛屑；鳥羽；蛋白；牛肉；胡蘿蔔；蕎麥；玉米；杏仁；茶；咖啡；大蒜；熟地黃；

### 檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

1. 一般以3級以上認定為可能之過敏原，有些醫師認為2級以上就應該注意。
2. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，都應該避免食用。
3. 對於檢測結果顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示在食用後兩小時內，並未誘發嚴重急性過敏症狀，仍然必須避免食用或減少服用次數。

〔註〕 即使檢測結果未顯示可能引起急性過敏的食物品項，如果過去經驗顯示食用後會誘發急性過敏症狀，亦應該嚴格避免食用。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀

# GE224 過敏檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：2013/11/12

## IgG慢性過敏反應圖譜

IgG慢性過敏反應圖譜		
重度	6級	
重度	5級	螃蟹；黃豆；
中度	4級	蝦子；地瓜；木瓜；花生；蓮子；
中度	3級	牡蠣；豌豆夾；馬鈴薯；芒果；小麥；蕎麥；咖哩；
輕度	2級	花枝；芹菜；南瓜；竹筍；胡蘿蔔；胡桃核桃；杏仁；
輕度	1級	菠菜；萵苣；花椰菜；小黃瓜；蘆筍；蕃茄；櫻桃；水蜜桃；椰子；米飯；花豆；芝麻；葵花籽；蜂蜜；蔥；

### 檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

#### IgG慢性食物過敏後續飲食建議

1. 重度反應：建議停止攝食6個月，之後每隔4天才攝食1次。
2. 中度反應：建議停止攝食3個月，之後每隔4天攝食1次，3個月後再正常攝食。
3. 輕度反應：2級：建議每隔4天才攝食1次，3個月後正常攝食。  
1級：避免每日大量食用，原則上可以安心攝食。

上述說明僅提供初步參考，仍須經由醫師做最後檢視與判讀